

Umfrage zur Impfbereitschaft gegen Corona

Beitrag von „Wollsocken80“ vom 12. Dezember 2020 21:57

[Zitat von samu](#)

Pharmazeutische Zeitung schrieb:

Allergische Reaktionen seien in der Phase-III-Studie zu BNT162b2 mit erfasst worden. Diese seien in der Gruppe der Teilnehmer, die den Covid-19-Impfstoff erhielten, bei 0,63 Prozent aufgetreten gegenüber 0,51 Prozent der Probanden in der Placebogruppe.

Das finde ich spannend, dass man auf ein Placebo allergisch reagieren kann. Ich glaube, der Zusammenhang zwischen Körper und Psyche ist noch viel weniger erforscht als dieser Impfstoff 🤔

Ansonsten weiß man noch gar nicht, welcher Stoff die allergische Reaktion ausgelöst hat. Also weder Allergolog*innen noch die Hersteller selbst, deswegen hilft -wieder mal- nur abwarten.

Du kannst die Details ja direkt bei Biontech nachlesen:

[Pfizer und BioNTech schließen Phase-3-Studie erfolgreich ab: Impfstoffkandidat gegen COVID-19 erreicht alle primären Endpunkte | BioNTech](#)

Klar kann man auch nach der Verabreichung eines Placebos erschöpft sein oder Kopfschmerzen haben, das sind Symptome die völlig zufällig auftreten können. Auch schon nur das Stechen mit einer Injektionsnadel kann erhebliche körperliche Symptome auslösen, das ist nichts Unbekanntes und wird sogar als Akupunkturtechnik angewandt (kann ich Dir ein Lied von singen ...). Je nachdem wie gut bzw. schlecht jemand im Stechen ist, hatte ich bei Impfungen und sonstigen Injektionen im Anschluss auch schon ziemliche Muskelschmerzen an der Einstichstelle.