

Umfrage zur Impfbereitschaft gegen Corona

Beitrag von „CDL“ vom 10. November 2021 15:23

Unter 30jährige sollen jetzt nur noch Comirnaty erhalten als Impfstoff, eine entsprechende Stiko-Erklärung wird gerade vorbereitet. Unter Moderna gab es bei jungen Männern wie Frauen auffällige Häufungen von Myokarditis-Fällen. Dürfte vor allem für euch in der Schweiz interessant sein @Antimon , nachdem Moderna euer Hauptimpfstoff ist. Gibt es bei euch ebenfalls veränderte Impfempfehlungen bzgl. Moderna?

Zitat von RKI

Die STIKO aktualisiert zurzeit ihre COVID-19-Impfempfehlung und empfiehlt laut Beschlussentwurf, Personen unter 30 Jahren ausschließlich mit dem Impfstoff Comirnaty zu impfen – der Beschlussentwurf ist in das vorgeschriebene [Stellungnahmeverfahren](#) gegangen. Änderungen sind möglich.

Achtung: Die FAQs werden zurzeit überarbeitet und erst nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens aktualisiert.

Zitat von RKI

(...)

Seit Einführung der COVID-19-Impfung mit den mRNA-Impfstoffen Comirnaty (BioNTech/Pfizer) und Spikevax (Moderna) ist bekannt, dass nach Verabreichung dieser Impfstoffe in seltenen Fällen Herzmuskel- und/oder Herzbeutelentzündungen (Myokarditis und Perikarditis) bei jüngeren Personen auftreten. Aktuelle Meldeanalysen zeigen, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jungen und jungen Männern sowie bei Mädchen und jungen Frauen unter 30 Jahren nach der Impfung mit Spikevax häufiger beobachtet wurden als nach der Impfung mit Comirnaty. Für Menschen ab 30 Jahren besteht nach der Impfung mit Spikevax kein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung und Herzbeutelentzündung.

(...)